

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОКЛЮША

Источник инфекции- больной человек. Механизм передачи – воздушно-капельный. Заражение происходит при близком и длительном общении с больным.

Инкубационный период составляет 7-21 день.

Клинические признаки.

К характерным клиническим проявлениям при коклюше относятся:

- Подострое начало заболевания с появлением непродуктивного кашля в течение 3-14 дней при отсутствии повышения температуры тела и катаральных явлений верхних дыхательных путей;
- Спастический приступообразный длительный кашель с гиперемией или цианозом лица, слезотечением, репризами - резкий судорожный вдох после спастического кашля, сопровождающийся свистящим протяжным звуком, рвотой, задержкой дыхания, апноэ - остановка дыхания, отхождением прозрачной мокроты, усиливающийся в ночное время, после физической нагрузки.
- Коклюш нередко осложняется бронхитами, отитом, пневмонией, выпадениями прямой кишки, пупочной и паховыми грыжами.

При появлении у ребенка симптомов заболевания, необходимо обратиться к врачу –педиатру.

После перенесенного коклюша длительное время может сохраняться кашлевая доминанта, в результате чего приступы кашля могут возвращаться в течение нескольких месяцев, особенно если ребенок простудится или при физической нагрузке.

Профилактика.

Соблюдать санитарно-гигиенические процедуры. Частое проветривание помещений, предупреждение скученности людей, обучение детей «дисциплине кашля», повышение неспецифического иммунитета.